

Maggiori informazioni

www.aids.ch

Tutto ciò che dovete sapere sul tema «Vivere con l'HIV» e su dove trovare i centri di consulenza.

www.drgay.ch

Informazioni e consulenza per uomini che fanno sesso con altri uomini.

Il presente dépliant è stato realizzato dall'Aiuto Aids Svizzero in collaborazione con **NAM Aidsmap UK**. Raccomandiamo di esaminare le informazioni riportate con un medico esperto.

HIV+

Effetti collaterali dei farmaci con- tro l'HIV




La maggior parte degli effetti collaterali di un trattamento dell'HIV sono temporanei. Se riscontrate problemi dovuti a effetti collaterali, parlatene con il vostro medico.

I farmaci anti-HIV tengono il virus sotto controllo, ma possono anche avere altri effetti sul vostro organismo.

Gli effetti aggiuntivi o indesiderati vengono chiamati effetti collaterali.

Effetti collaterali di breve durata



Diarrea/nausea

Il corpo deve abituarsi ai farmaci contro l'HIV. La maggior parte degli effetti collaterali scompare dopo qualche settimana. Possono essere alleviati con altri farmaci.




Stanchezza




Disturbi del sonno


Effetti collaterali di lunga durata



Fate controllare regolarmente lo stato del fegato, dei reni e delle ossa.



Il controllo dei valori del colesterolo e della glicemia può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, di diabete, pressione alta o infarto.



Alterazioni fisiche (perdita o aumento di grasso in specifiche zone del corpo).